

## Evaluation de l'infestation résiduelle varroa



Traitement utilisé :

Date de la dernière visite du corps avec examen du couvain :

	Date	Comptage varroas Ruche 1	Comptage varroas Ruche 2	Comptage varroas Ruche 3	Comptage varroas Ruche 4	Comptage varroas Ruche 5	Comptage varroas Ruche 6	Comptage varroas Ruche 7	Comptages varroas Ruche 8	Comptages varroas Ruche 9	Comptages varroas Ruche 10
Pose des lanières											
Réévaluation de la position des lanières											
Retrait des lanières (J0)											
J0+10 : pose plateau											
Comptages et nettoyage plateau	J+12										
	J+15										
	J+18										
J0+20 : dernier comptage	J+20										
TOTAL											
OBJECTIF		<b>Un total &gt; 5 varroas en 10 jours en période hivernale : critère d'alerte (traitement de rattrapage conseillé)</b>									

Comptage proposé sur 10 jours , sur plateau grillagé, à commencer 10 jours après le retrait des lanières afin d'uniformiser les résultats.

Information à conserver dans votre registre d'élevage. Merci de nous retourner cette information par les moyens à votre convenance.

Mail : [gds44@reseaugds.com](mailto:gds44@reseaugds.com) / Courrier : GDS44 rue Pierre Adolphe Bobierre 44939 NANTES Cedex 9 / Fax : 0240163919




## Notice : Evaluation de l'infestation résiduelle varroa

Le comptage des varroas morts naturellement permet d'approcher le niveau de l'infestation varroa de façon simple, sans avoir à ouvrir la ruche :



10 jours après le retrait des lanières

- Placer un linge graissé au fond de la colonie, de telle manière à ce qu'il soit inaccessible aux abeilles tout en recueillant les varroas qui tombent.
- Le linge peut par exemple être placé sous un plancher grillagé ou sur le plancher de la ruche protégé par une grille (pour empêcher le nettoyage spontané des abeilles).
- Il doit être relevé au minimum 2 fois minimum à 5 jours d'intervalle et si possible à J12 - J15 - J18 et J20.



Les varroas piégés sont dénombrés et divisés par le nombre de jours où le linge était présent.

Remplir le tableau joint

Nous retourner les informations au GDS

La fréquence des chutes de varroas est variable en fonction de la saison. A l'issue du traitement, **l'objectif est d'observer moins de 1 varroa tous les 2 jours**. Il est important sinon d'envisager un traitement de rattrapage hivernal à l'Api-bioxal.

### NOMBRE DE COLONIES A SURVEILLER SUIVANT LA TAILLE DE SON RUCHER :

Moins de 5 colonies	<b>Toutes</b>
6 à 20 colonies	<b>Minimum 5</b>
Plus de 20 colonies	<b>Minimum 8</b>